## AVERTISSE MDE N-2T78478618 AGRICOLES

BULLETIN **TECHNIQUE STATIONS** D'AVERTISSEMENTS **AGRICOLES** 

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION de la STATION "AQUITAINE" (Tél. (56) 86-22-75) GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES ATLANTIQUES

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture Chemin d'Artigues, 33 - CENON

C. C. P. : BORDEAUX 6702-46 X

ABONNEMENT ANNUEL

30,00 Francs

SUPPLIMENT Nº 1 AU BULLETIN TECHNIQUE Nº 149 DE FEVRIER 1973

I973-3

CLOQUE DU PECHER

La période de sensibilité maximum du pêcher à la cloque débute au moment de l'ouverture des bourgeons et se termine lors de liétalement des premières feuilles. Par la suite, des infections sont encore possibles mais généralement sans gravité.

Une application préventive de fongicides est donc nécessaire lorsque les bourgeons à bois les plus avancés atteignent le stade B qui correspond à des bourgeons dont les écailles entr'ouvertes laissent apercevoir en regardant par dessus, la pointe verte ou rougeâtre de la première feuille.

Actuellement seules les variétés à floraison précoce (loring, Elberta, Red haven, de nombreuses nectarines ... ) sont proches du stade B et susceptibles d'être traitées au cours des prochains jours si l'évolution de la végétation le justifie. Dans les vergers constitués de variétés à floraison échelonnée, il est préférable d'intervenir séparément sur chaque variété ( ou groupe de variétés) en attendant pour charune d'elles le stade phénologique sensible (B).

Il est très important de ne pas traiter trop tard, en particulier en laissant se développer sans protection les bourgeons des extremités des prolongements qui débourrent généralement quelques jours avant les autres.

Les produits homologués contre la cloque du pêcher sont les suivants :

- Bouillie Bordelaise et Bourguignonne, Oxychlorure de cuivre, Oxyde cuivreux, Sulfate basique de cuivre = 500 Grs de cuivre métal/hl.

Captafol = 120 grs M.A./hl. Captane = 250 grs M.A./hl. Zirame = 175 grs H.A./hl.

Thirame = 175 Grs M.A./hl.

Ferbame = 175 Grs M.A./hl.

Association de Zirame et de Cuivre = dose homologuée pour chaque spécialité.

Cenon, le 12 Février 1973

L'Ingénieur d'Agronomie et L'Ingénieur des Travaux Agricoles chargés des Avertissements Agricoles J. TOUZEAU . C. VANEQUE

Imprimerie de la Station de Bordeaux Directeur-Gérant: L. BOUYX

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie Chef de la Circonscription Phytosanitaire \* Aquitaine " M. LARGE